



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP

Prezados,

Sejam bem vindos ao simulado para Comissário de Bordo. Informamos os Senhores que os simulados aqui presente foram feitos em caráter caseiro, então provavelmente haverá erros de ortografia entre outros, peçamos a colaboração de todos, pois este simulado esta ai para ajuda-los, diferente dos simulados encontrados pela Internet este é completamente grátis.

A AFAC espera que os senhores aproveitem, e que estes simulados possa ajuda-los. Bom simulado e Obrigado!

1 - Nas contusões ocorridas a bordo, o melhor analgésico é:

- A-mercúrio cromo no local
- B-água oxigenada no local
- C- gelo no local
- D-tomar aspirina

2 - Qual o alimento que no vôo produz aerodilação no aparelho digestivo:

- vegetais
- arroz
- feijão
- bebida sem gás

3 - A formação de bolhas de nitrogênio em várias partes do organismo recebe o nome de:

- aeroembolismo
- catalepsia
- hemoptise
- epistaxe

4 - Uma criança de colo, tanto no pouso quanto na decolagem da aeronave, apresenta choro forte, com movimentação e contração dos braços. Provavelmente a causa desta inquietação é:



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP

- dor de barriga
- fome
- dor de ouvido
- fraldas molhadas

5 - A última fase do parto:

- dilatação do colo do útero
- eliminar o feto
- contração do colo do útero
- eliminar a placenta

6 - A um pax com parada respiratória deve-se, de imediato:

- dar-lhe oxigênio
- colocá-lo sentado com a cabeça na posição vertical
- medir seus sinais vitais
- fazer respiração boca-a-boca numa frequência de 12 a 20 incursões por minuto

7 - A aerotite pode se instalar durante uma descida da aeronave devido à inadequada equalização da pressão da cabine com o interior do:

- seios da face
- ouvido interno
- ouvido médio
- ouvido externo

8 - Em um vôo que são cruzados mais de 4 fusos horários causa no organismo:

- aeroembolia
- desorientação vestibular
- alteração do ritmo cicardiano
- hipóxia



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP

9 - A asma brônquica causa:

- diarreia
- dor de cabeça
- convulsão
- dispnéia

10 - Sendo a fadiga aérea causada por excesso de tensão, tanto física quanto mental, o tripulante para diminuí-la deverá:

- usar medicamentos ou bebidas alcóolicas
- induzir um sono com medicamentos para um melhor descanso
- ter um sono fisiológico de oito horas
- distrair-se, passando grande parte de seu tempo acordado

11 - A conduta realizada em um epilético será:

- administrar oxigênio com o paciente sentado
- dar calmante e água com açúcar
- proteção do mesmo para que não se machuque ao debater-se
- desobstruir vias aéreas

12 - Icterícia é um dos sintomas de:

- peste bubônica
- febre amarela
- malária
- cólera

13 - Devido à possibilidade de provocar uma emergência obstétrica, o vôo deve estar contra-indicado para gestante acima do:

- quinto mês
- oitavo mês



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP

- sétimo mês
- quarto mês

14 - Sintomas de cefaléia, formigamento no corpo, falta de coordenação motora indicam:

- hipotermia
- paludismo
- desmaio
- aeroembolismo

15 - Em pessoa alcoolizada, porém não agressiva, deve-se:

- oferecer líquidos bem açucarados
- oferecer café sem açúcar
- colocar gelo sobre a cabeça
- oferecer água gelada

16 - A diminuição da pressão parcial do oxigênio no organismo é denominada:

- disbarismo
- hipóxia
- dispepsia
- anóxia

17 - São sintomas de hipóxia:

- apatia, taquipnéia
- euforia, belicosidade, irritabilidade
- taquisfigmia
- cefaléia e mal estar gástrico

18 - As patologias da boca podem ser evitadas com o hábito de:



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP

- bochegar com álcool
- eliminar o açúcar em todos os tipos de alimentos
- escovar os dentes com pasta dentifrícia diariamente
- só ingerir alimentos líquidos diariamente

19 - Os sintomas mais comuns em passageiros expostos a hipóxia de altitude são:

- Alterações visuais e leves desmaios
- dor de cabeça e vômito
- diarreia e tontura
- diarreia e crise convulsiva

20 - O tratamento adequado para os quadros de hipóxia é:

- oxigenoterapia
- vasoconstrição
- repouso
- broncodilatador

Gabarito

1-C 2-A 3-C 4-C 5-D 6-D 7-C 8-C 9-D 10-C 11-C 12-B 13-C 14-D 15-A 16-B 17-B 18-C
19-A 20-A

Obrigado por ter realizados os nossos simulados de Comissario de Brodo, esperamos que tenham lhe ajudado nos seus estudos , para fazer criticas ou sugestões entre em contato através do email afaccb@gamil.com.

Muito obrigado pela escolha e boa sorte em sua banca.



ASSOCIAÇÃO DOS FREQUENTADORES DO AEROPORTO
DE CASA BRANCA - SP